

Таблица 2 – Морфологические, тинкториальные и культуральные свойства производственных штаммов бактерий *E. coli*

Название штамма	Описание морфологических и культуральных свойств
<i>E.coli M-17</i>	В мазках, окрашенных по Граму, должны обнаруживаться подвижные грамтрицательные одиночные палочки с закругленными концами длиной от 1,5 до 4,0 мкм. Факультативный анаэроб; через (15 ± 3) ч инкубации при температуре $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$ на мясопептонном агаре образует бесцветные круглые с ровными краями выпуклые колонии; на среде Эндо образует красные колонии с зеленоватым металлическим блеском; на мясопептонном бульоне через (3 ± 1) ч происходит равномерное помутнение среды. Оптимальная температура роста $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$
<i>E. coli Г-35-1/59</i>	В мазках, окрашенных по Граму, должны быть подвижные прямые грамтрицательные одиночные палочки с закругленными концами длиной от 1,5 до 4,0 мкм. Факультативный анаэроб; через (15 ± 3) ч инкубации при температуре $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$ на мясопептонном агаре образует круглые гладкие полупрозрачные слабовыпуклые колонии диаметром $(2,0 \pm 0,5)$ мм с ровными краями; на среде Эндо образует красные колонии без металлического блеска; на мясопептонном бульоне через (3 ± 1) ч происходит равномерное помутнение среды. Оптимальная температура роста $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$
<i>E. coli Г-35-1/60</i>	В мазках, окрашенных по Граму, должны присутствовать подвижные прямые грамтрицательные одиночные палочки с закругленными концами длиной от 1,5 до 4,0 мкм. Факультативный анаэроб; через (15 ± 3) ч инкубации при температуре $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$ на мясопептонном агаре образует круглые гладкие полупрозрачные слабовыпуклые колонии диаметром $(2,0 \pm 0,5)$ мм с ровными краями; на среде Эндо образует красные колонии с металлическим блеском; на мясопептонном бульоне через (3 ± 1) ч происходит равномерное помутнение среды. Оптимальная температура роста $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$
<i>E. coli Г-35-1/61</i>	В мазках, окрашенных по Граму, должны определяться подвижные прямые грамтрицательные одиночные палочки с закругленными концами длиной от 1,5 до 4,0 мкм. Факультативный анаэроб; через (15 ± 3) ч инкубации при температуре $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$ на мясопептонном агаре образует круглые гладкие полупрозрачные слабовыпуклые колонии диаметром $(2,0 \pm 0,5)$ мм с ровными краями; на среде Эндо образует светло-красные колонии без металлического блеска; на мясопептонном бульоне через (3 ± 1) ч происходит равномерное помутнение среды. Оптимальная температура роста $(37 \pm 1) ^\circ\text{C}$