

---

**Рифампицин, лиофилизат для  
приготовления раствора для инфузий**

**ФС.3.1.0092.18**

**Рифампицин, лиофилизат для  
приготовления раствора для инфузий**

**Rifampicini lyophilisatum  
pro solutione infusionali**

**Взамен ФС 42-2965-93**

---

Настоящая фармакопейная статья распространяется на лекарственный препарат рифампицин, лиофилизат для приготовления раствора для инфузий. Препарат должен соответствовать требованиям ОФС «Лиофилизаты», ОФС «Лекарственные формы для парентерального применения» и ниже приведенным требованиям.

Препарат получают лиофилизацией из раствора, содержащего необходимое количество рифампицина и вспомогательных веществ.

Содержит не менее 90,0 % и не более 115,0 % от заявленного количества рифампицина  $C_{43}H_{58}N_4O_{12}$  в одном флаконе или ампуле.

**Описание.** Содержание раздела приводится в соответствии с требованиями ОФС «Лиофилизаты».

**Подлинность.**

*1. ВЭЖХ.* Время удерживания пика основного вещества на хроматограмме испытуемого раствора должно соответствовать времени удерживания пика рифампицина на хроматограмме раствора стандартного образца рифампицина (раздел «Родственные примеси»).