

раствора помещают в мерную колбу вместимостью 100 мл, доводят объем раствора тем же растворителем до метки и перемешивают.

Раствор используют свежеприготовленным.

Раствор сравнения. 0,1 М раствор кислоты хлористоводородной.

Измеряют оптическую плотность испытуемого и стандартного растворов на спектрофотометре в максимуме поглощения при длине волны 297 нм в кювете с толщиной слоя 10 мм.

Содержание этилметилгидроксипиридина сукцината $C_8H_{11}NO \cdot C_4H_6O_4$ в одной капсуле в процентах от заявленного количества (X) вычисляют по формуле:

$$X = \frac{A_1 \cdot a_0 \cdot 100 \cdot 1 \cdot 100 \cdot P \cdot G}{A_0 \cdot a_1 \cdot 100 \cdot 1 \cdot 100 \cdot L} = \frac{A_1 \cdot a_0 \cdot P \cdot G}{A_0 \cdot a_1 \cdot L}$$

- где A_1 – оптическая плотность испытуемого раствора;
 A_0 – оптическая плотность стандартного раствора;
 a_0 – навеска стандартного образца этилметилгидроксипиридина сукцината, мг;
 a_1 – навеска содержимого капсул, мг;
 P – содержание этилметилгидроксипиридина сукцината в стандартном образце этилметилгидроксипиридина сукцината, %;
 G – средняя масса содержимого одной капсулы, мг;
 L – заявленное количество этилметилгидроксипиридина сукцината в одной капсуле, мг.

Хранение. В защищенном от света месте.