Сенны листья

Sennae folia

Собранные в фазу цветения и плодоношения, высушенные и обмолоченные листья дикорастущих и культивируемых многолетних кустарников кассии остролистной (сенны) — Cassia acutifolia Del. (С. senna L.) и кассии узколистной — Cassia angustifolia Vahl., сем. бобовых — Fabaceae.

ПОДЛИННОСТЬ

Внешние признаки. Цельное сырье. Отдельные листочки и черешки сложного парноперистого листа, цельные или частично измельченные; кусочки тонких травянистых стеблей; бутоны; цветки и незрелые плоды. Листочки удлиненно-ланцетовидные (Cassia angustifolia) или ланцетоовальные (Cassia acutifolia), заостренные к верхушке, наиболее широкие в средней части, у основания неравнобокие, тонкие, ломкие, цельнокрайние, с очень коротким черешком. Вторичные жилки, ясно заметные с обеих сторон, отходят под острым углом от главной жилки и соединяются между собой дугами, идущими параллельно краю листочка. Длина листочка 1-6 см (2-6 см у Cassiaangustifolia и 1-3,5 см у Cassiaacutifolia), ширина 0,4–2 см (0,6–2 см у Cassiaangustifolia и 0,4–1,2 см у Cassiaacutifolia). Плод боб, плоский, кожистый, слабоизогнутый, 3–5 см длиной, 1,5-2 см шириной. Цвет листочков от серовато-зеленого (Cassia acutifolia) или желтовато-зеленого (Cassia angustifolia) до коричневатозеленого (Cassia acutifolia, Cassia angustifolia), матовый, иногда верхняя и