
Термопсиса ланцетного трава

ФС.2.5.0096.18

Thermopsis lanceolatae herba

Взамен ГФ XI, вып. 2, ст. 59

Собранная в начале цветения до появления плодов и высушенная трава дикорастущего многолетнего травянистого растения термопсиса ланцетного – *Thermopsis lanceolata* R. Br., сем. бобовых – *Fabaceae*.

ПОДЛИННОСТЬ

Внешние признаки. *Цельное сырье.* Цельные или частично измельченные стебли с листьями и цветками. Стебли простые или ветвистые, бороздчатые, слабоопушенные, длиной до 30 см. Листья очередные, тройчатые на коротких черешках (4 - 7 мм), с продолговатыми или продолговато - ланцетными листочками длиной 30 - 60 мм, шириной 5 - 12 мм. Сверху почти голые, снизу покрыты прижатыми волосками. Прилистники ланцетные, почти вдвое короче листочка, опушены прижатыми волосками. Цветки собраны мутовками в негустую верхушечную кисть. Чашечка колокольчатая, пятизубчатая с неравными по длине зубцами, опушена прижатыми волосками. Венчик мотыльковый, желтый, длиной 25 - 28 мм, верхний лепесток (флаг) с почти округлым отгибом, на верхушке с глубоким и узким вырезом; два боковых лепестка (крылья) лишь немного короче флага; нижние сросшиеся лепестки (лодочка) в 1,5 - 2 раза шире крыльев. Тычинок 10, все свободные; пестик 1 с тонким изогнутым столбиком и верхней одногнездной шелковисто-опушенной завязью. Цвет стеблей и листьев серовато-зеленый.

Запах слабый, своеобразный.

Вкус водного извлечения не определяют (сырье ядовито).