
Шиповника плоды

ФС.2.5.0106.18

Rosae fructus

**Взамен ГФ XI, вып. 2, ст. 38
(изм. № 4 от 19.08.1998)**

Собранные в период полного созревания и высушенные плоды дико-растущих и культивируемых кустарников различных видов шиповника (розы) – *Rosa*: шиповника майского – *R. majalis Herrm. (R. cinnamomea L.)*; шиповника иглистого – *R. acicularis Lindl.*; шиповника даурского – *R. davurica Pall.*; шиповника Беггера – *R. beggeriana Schrenk.*; шиповника Федченко – *R. fedtschenkoana Regel.*; шиповника морщинистого – *R. Rugosa Thunb.* и других видов шиповника, сем. розоцветных – *Rosaceae*.

ПОДЛИННОСТЬ

Внешние признаки. *Цельное сырье.* Цельные, очищенные от чашелистиков и плодоножек ложные плоды разнообразной формы: от шаровидной, яйцевидной или овальной до сильно вытянутой веретеновидной; длина плодов – 0,7 - 3 см, диаметр 0,6 - 1,7 см. На верхушке плода имеется небольшое круглое отверстие или пятиугольная площадка. Плоды состоят из разросшегося мясистого, при созревании сочного цветоложа (гипантия) и заключенных в его полости многочисленных плодиков – орешков. Стенки высушенных плодов твердые, хрупкие, наружная поверхность блестящая, реже матовая, более или менее морщинистая. Внутри плоды обильно выстланы длинными, очень жесткими щетинистыми волосками. Орешки мелкие, продолговатые, со слабо выраженными гранями.