
Боярышника плодов настойка

ФС.3.4.0001.18

Crataegi fructi tinctura

Взамен ФС 42-1652-99

Боярышника плодов настойка, получаемая из плодов дикорастущих и культивируемых кустарников или небольших деревьев разрешенных к медицинскому применению видов растения боярышника (*Crataegus*), сем. розоцветных – *Rosaceae*, и применяемая в качестве лекарственного препарата.

Для получения настойки используют:

боярышника плодов измельченных - 100 г;
этанолола (спирта) 70 % - достаточное количество
для получения 1000 мл.

Описание. Прозрачная жидкость от светло-желтого или светло-коричневого до красно-коричневого цвета с характерным запахом.

Подлинность.

Приготовление растворов.

Раствор стандартного образца (СО) гиперозида. Около 0,005 г СО гиперозида, предварительно высушенного при температуре от 130 до 135 °С в течение 3 часов, растворяют при нагревании на водяной бане в 10 мл спирта 70 %.

Срок годности раствора не более 3 мес при хранении в прохладном, защищенном от света месте.

Раствор стандартного образца (СО) кверцетина. Около 0,005 г СО кверцетина, предварительно высушенного при температуре от 130 до 135 °С в течение 3 часов, растворяют при нагревании на водяной бане в 10 мл спирта 70 %.

Срок годности раствора не более 3 мес при хранении в прохладном, защищенном от света месте.

Раствор стандартного образца (СО) рутина. Около 0,005 г СО рутина, предварительно высушенного при температуре от 130 до 135 °С в течение 3 часов, растворяют при нагревании на водяной бане в 10 мл спирта 70 %.