
Кверкус (4)

ФС.2.6.0027.18

Quercus (4)

Настойка гомеопатическая матричная

Вводится впервые

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Кверкус (4) - Quercus (4) настойку гомеопатическую матричную, получаемую из высушенной коры дуба обыкновенного *Quercus robur* L., и дуба скального *Quercus petraea* Liebl., сем. буковых – *Fagaceae*, применяемую для производства/изготовления гомеопатических лекарственных препаратов.

Для получения настойки необходимо

Дуба коры высушенной - 100 г

Спирта этилового 62 % (м/м), 70 % (о/о) - достаточное количество для получения настойки

Примечание

Получение настойки гомеопатической матричной осуществляют из измельченного сырья (0,71 мм) по способу 4 ОФС «Настойки гомеопатические матричные».

Описание

Жидкость красно-коричневого цвета, с характерным запахом.

Подлинность

1. Тонкослойная хроматография.

На линию старта аналитической хроматографической пластинки наносят 20 мкл настойки и 1 мкл раствора стандартного образца (СО) галловой кислоты (см. «Количественное определение») в виде точки. Пластинку сушат на воздухе и помещают в камеру, предварительно насыщенную в течение 30 мин смесью растворителей этилацетат –