

Тритурацию D1 готовят в соответствии с ОФС «Тритурации гомеопатические» из порошков.

Раствор D1 готовят в соответствии с ОФС «Растворы и жидкие разведения гомеопатические» (растворы гомеопатические) с использованием спирта этилового 15 % (м/м). Последующие разведения готовят с использованием спирта этилового 43 % (м/м).

### **Описание**

Раствор D1 – бесцветная, прозрачная жидкость.

Тритурация D1 – белый порошок.

### **Подлинность**

1,0 г тритурации D1 растворяют при нагревании в 10,0 мл воды. Полученный раствор или раствор D1 дают реакции подлинности для субстанции.

**Прозрачность.** Раствор D1 должен быть прозрачным (ОФС «Прозрачность и степень мутности жидкостей»).

**Цветность.** Раствор D1 должен быть бесцветным (ОФС «Степень окраски жидкостей»).

**Плотность.** Раствор D1: От 1,043 до 1,053 (ОФС «Плотность»).

**Микробиологическая чистота.** В соответствии с ОФС «Микробиологическая чистота».

### **Количественное определение.**

10,0 г раствора D1 (точная навеска) разводят 50,0 мл воды или 10,0 г тритурации D1 (точная навеска) растворяют в 50,0 мл воды.

Используют метод, приведенный для субстанции.

**Хранение.** В плотно закрытой упаковке.