

---

<b>Эхинацея пурпуреа (4)</b>	<b>ФС.2.6.0053.18</b>
<b>Echinacea purpurea (4)</b>	
<b>Настойка гомеопатическая матричная</b>	<b>Вводится впервые</b>

---

Настоящая фармакопейная статья распространяется на Эхинацея пурпуреа (4) - *Echinacea purpurea* (4) настойку гомеопатическую матричную, получаемую из высушенной травы эхинацеи пурпурной - *Echinacea purpurea* L., сем. астровых - *Asteraceae* и применяемую для производства/изготовления гомеопатических лекарственных препаратов.

**Для получения настойки необходимо:**

Эхинацеи пурпурной травы высушенной - 100 г

Спирта этилового 62 % (м/м) или 70 % (о/о) - достаточное количество для получения настойки

**Примечание**

Получение настойки гомеопатической матричной осуществляют по способу 4 ОФС «Настойки гомеопатические матричные».

**Описание.** Прозрачная жидкость зеленовато-коричневого цвета, с характерным запахом.

**Подлинность**

1. *Тонкослойная хроматография*

*Приготовление растворов.*

*Раствор тимола 1 %.* 1,0 г тимола растворяют в 100 мл спирта 96 % и перемешивают. Срок годности раствора 30 сут.

*Раствор стандартного образца (СО) кофейной кислоты.* 0,02 г СО кофейной кислоты растворяют в 10 мл спирта 70 % и перемешивают. Срок годности раствора 30 сут.