
Пробиотик лактобактерий	ФС.3.3.1.0077.18
монокомпонентный,	
суппозитории вагинальные	Взамен ФС 42-3950-00

Настоящая фармакопейная статья распространяется на пробиотик лактобактерий монокомпонентный, суппозитории вагинальные. Активным компонентом препарата является биомасса живых антагонистически активных бактерий штамма *Lactobacillus plantarum* 8P-A3 или *Lactobacillus fermentum* 90T-C4. В одном суппозитории (дозе) препарата должно содержаться не менее 10^7 КОЕ лактобактерий.

ПРОИЗВОДСТВО

Производство препарата должно осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в ОФС «Лактосодержащие пробиотики», ОФС «Пробиотики» и ОФС «Производственные пробиотические штаммы и штаммы для контроля пробиотиков».

Контроль качества производственных пробиотических штаммов и штаммов для контроля пробиотиков проводится не реже 1 раза в год.

ИСПЫТАНИЯ

Описание. Суппозитории от белого до светло-бежевого цвета, торпедо-видной или цилиндрической формы; допускается неоднородность цвета в виде вкраплений или «мраморности». Определение проводят визуально.

Подлинность. В мазках, окрашенных по Граму, должны присутствовать грамположительные прямые палочки длиной от 0,7 до 3,0 мкм, располагающи-