

Собранные в начале цветения и высушенные соцветия дикорастущих и культивируемых кустарников или небольших деревьев: боярышника кроваво-красного – *Crataegus sanguinea* Pall.; боярышника сглаженного – *C. laevigata* (Poir.) DC. (боярышника колючего – *C. oxyacantha sensu* Rojark.); боярышника Королькова – *C. korolkowii* L. Henry; боярышника [алтайского – *C. altaica* (Loud.) Lange]; боярышника желтого – *C. chlorocarpa* Lenne et C. Koch; боярышника даурского – *C. dahurica* Koehne ex Schneid.; боярышника однопестичного – *C. monogyna* Jacq.; боярышника германского – *C. alemanniensis* Cin.; боярышника восточно-балтийского – *C. orientobaltica* Cin.; боярышника отогнуточашелистикowego – *C. curvisepala* Lindm.; боярышника курземского – *C. X curonica* Cin.; боярышника даугавского – *C. X dunensis* Cin.; боярышника пятипестичного – *C. pentagyna* Waldst. et Kit., сем. розоцветных – *Rosaceae*.

ПОДЛИННОСТЬ

Внешние признаки. Цельное сырье. Смесь цельных щитковидных, реже зонтиковидных соцветий и их частей – отдельных цветков, бутонов, цветоножек, лепестков, тычинок и пыльников. Цветки правильные, с двойным околоцветником, состоящим из 5 продолговато-треугольных, треугольных или узких ланцетных зеленоватых чашелистиков и 5 овальных коричневато- или желтовато-белых лепестков; тычинок до 20, с красными пыльниками, столбиков 1-5; цветоножки обычно голые или слабо опушенные, длиной до