
Брусники обыкновенной листья

ФС.2.5.0063.18

Vaccinii vitis-idaeae folia

Взамен ГФ XIст.27

Собранные до начала цветения или после созревания плодов и высушенные листья многолетнего вечнозеленого дикорастущего кустарничка брусники обыкновенной – *Vaccinium vitis-idaea* L., семейства вересковых – *Ericaceae*.

ПОДЛИННОСТЬ

Внешние признаки. *Цельное сырье.* Смесь цельных или частично измельченных листьев. Листья короткочерешковые, кожистые, эллиптические или обратнояйцевидные, на верхушке притупленные или слабовеямчатые с цельными или слегка зазубренными, завернутыми вниз краями, длиной 7 – 30 мм, шириной 5 – 15 мм. При рассмотрении под лупой (10×) или стереомикроскопом (16×) на нижней поверхности листа видны многочисленные темно-коричневые точки (железки). Черешки листьев в поперечном сечении округло-треугольной формы, покрытые волосками.

Цвет листьев сверху зеленый или темно-зеленый, снизу от светло-зеленого до серовато-зеленого с ясно заметными темно-коричневыми точками (железками) изредка с коричневыми, фиолетово-коричневыми или розовато-фиолетовыми пятнами. Запах отсутствует, вкус водного извлечения горький, вяжущий.

Измельченное сырье. Кусочки листьев различной формы черешков, проходящих сквозь сито 3 мм. При рассмотрении под лупой (10×) или стереомикроскопом (16×) видны кусочки листьев различной формы, на нижней поверхности листьев многочисленные темно-коричневые точки (железки).