

Собранные в период цветения, высушенные и обмолоченные цветки и бутоны дикорастущего и культивируемого кустарника бузины черной – *Sambucus nigra* L., сем.бузиновых – *Sambucaceae* (жимолостных – *Caprifoliaceae*).

#### ПОДЛИННОСТЬ

**Внешние признаки. Цельное сырье.** Смесь отдельных цветков, бутонов на коротких голых цветоножках длиной до 2–3 мм и без них, частей соцветий. Цветки с пятизубчатой спайнолепестной чашечкой и венчиком из 4–5 лепестков, сросшихся у основания, диаметром до 8 мм. Диаметр бутонов – до 3 мм. Лепестки венчика широко-яйцевидные, почти округлые. Чашелистики треугольные, эллиптические или яйцевидные желтовато-зеленого цвета. Тычинок 5, приросших к трубке венчика, завязь почти шаровидная короткая полунижняя, трехгнездная. Цвет желтоватый или желтый. Запах характерный. Вкус водного извлечения пряный.

**Измельченное сырье.** При рассмотрении измельченного сырья под лупой (10×) или стереомикроскопом (16×) видны отдельные цельные цветки, бутоны на коротких голых цветоножках и без них, части цветков, бутонов и цветоножек, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм.

Цвет желтоватый или желтый с беловато- или зеленовато-серыми вкраплениями. Запах характерный. Вкус водного извлечения пряный.

**Порошок.** При рассмотрении измельченного сырья под лупой (10×) или стереомикроскопом (16×) видна смесь частиц цветков, бутонов и