

Горца птичьего (спорыша) трава	ФС.2.5.0069.18
<i>Polygoni avicularis herba</i>	Взамен ГФ XI ст. 56

Собранная в фазу цветения и высушенная трава дикорастущего однолетнего травянистого растения горца птичьего (спорыша) – *Polygonum aviculare* L., сем. гречишных – *Polygonaceae*.

#### ПОДЛИННОСТЬ

**Внешние признаки.** *Цельное сырье.* Цельные или частично измельченные олиственные цветоносные побеги длиной до 40 см. Стебли тонкие, ветвистые, цилиндрические, коленчатые. Корни тонкие стержневые, ломкие, желтоватые. Листья простые, очередные, короткочерешковые, цельнокрайние, различные по форме, широколопатчатые или широкоэллиптические, обратнойцевидные, реже узкопродолговатые или почти линейные, тупые или островатые, длиной до 3 см, шириной до 1 см. У основания листьев находятся два прилистника, сросшиеся в раструб. Раструбы серебристо-белые, пленчатые, рассеченные. Цветки расположены в пазухах листьев по 1 – 5. Цветки на коротких цветоножках; околоцветник простой, длиной 3 – 5 мм, глубоко надрезанный почти до 2/3, пятичленный. Тычинок 6 (8), пестик с верхней одногнездной завязью и 2 – 3 столбиками.

Цвет листьев и стеблей зеленый или серовато-зеленый, околоцветника в нижней части – бледно-зеленый, в верхней – белый или розовый. Запах слабый. Вкус водного извлечения слегка вяжущий.

*Измельченное сырье.* Кусочки стеблей, листьев и цветков, иногда корней, различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Цвет серовато-зеленый. Запах слабый. Вкус водного извлечения слегка вяжущий.