
Змеевика корневища

ФС.2.5.0074.18

Bistortae rhizomata

Взамен ГФ XI ст. 71

Собранные после отцветания, очищенные от корней, остатков листьев и стеблей, отмытые от земли и высушенные корневища дикорастущих многолетних травянистых растений змеевика большого (горца змеинового) – *Bistorta major* S. F. Gray (*Polygonum bistorta* L.) и змеевика мясо-красного (горца мясокрасного) – *Bistorta carnea* (C. Koch) Kom. (*P. carneum* C. Koch), сем. гречишных – *Polygonaceae*.

ПОДЛИННОСТЬ

Внешние признаки. Цельное сырье. Корневище твердое, змеевидно-изогнутое, несколько сплюснутое, с поперечными кольчатыми утолщениями и следами обрезанных корней. Длина корневища 3 – 10 см, толщина 1,5 – 2 см. Цвет пробки темный, красновато-бурый; на изломе – розоватый или коричневато-розовый, излом ровный. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения сильно вяжущий.

Измельченное сырье. Кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 7 мм. Цвет корневищ в изломе коричнево-розовый, цвет пробки темный, красновато-коричневый. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения сильно вяжущий.

Порошок. Кусочки корневищ различной формы, проходящие сквозь сито с отверстиями размером 2 мм. Цвет от розоватого до коричнево-розового с темными, красновато-коричневыми вкраплениями. Запах отсутствует. Вкус водного извлечения сильно вяжущий.